

泌尿器科癌

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与日	1サイクル期間	癌種
GEM+CDDP	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day 1,8,15 day 1	28日	尿路上皮癌
DTX	ドセタキセル PSL	75mg/m <sup>2</sup> 5~10mg/day	点滴静注 内服	day 1 連日	21日	前立腺癌
CBZ	カバジタキセル PSL	25mg/m <sup>2</sup> 5~10mg/day	点滴静注 内服	day 1 連日	21日	前立腺癌
EP	エトポシド シスプラチン	100mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	day 1,8,15 day 1	28日	胚細胞腫瘍
Nivolumab(2週毎又は4週毎)	ニボルマブ	240mg又は480mg/body	点滴静注	day 1	14又は28日	腎細胞癌
Nivolumab+Cabozantinib	ニボルマブ カボザンチニブ	480mg/body 40mg	点滴静注 内服	day 1 1回空腹時/day	14日	腎細胞癌
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	点滴静注	day 1 day 1	21日	腎細胞癌
Pembrolizumab(3週毎又は6週毎)	ペムブロリズマブ	200mg又は400mg/body	点滴静注	day 1	21又は42日	尿路上皮癌
Pembrolizumab(3週毎又は6週毎) Lenvatinib	ペムブロリズマブ レンバチニブ	200mg/body 20mg	点滴静注 内服	day 1 連日	21又は42日	腎細胞癌