

24. 赤ちゃんへのビタミンKシロップ(ケイツーシロップ)投与について

ケイツーシロップのご自宅での飲ませ方



ケイツーシロップは赤ちゃんのビタミンK不足による出血症を予防する目的で、週1回計13回内服となります。入院中に2回内服し、退院時に11回分お渡ししています。

いくつか方法がありますのでお母さまのやりやすい方法をお選びください

<スプーンで飲ませる場合>

スプーンに原液シロップを取り分けて少しずつ口の中に流し込みます。1人で抱っこして飲ませるのは難しいので、一人が抱っこし、もう一人がスプーンで飲ませるというようにご家族に手伝ってもらおうとスムーズです。

<哺乳瓶の乳首で飲ませる場合>

哺乳瓶の乳首だけをおしゃぶりの様に赤ちゃんにくわえさせます。乳首を支えながらその中に薬を流し入れます。

<哺乳瓶で飲ませる場合>

少量の湯冷ましにシロップを混ぜます。量が多いと飲み残しになるので10ml程度に混ぜて飲ませます。

注意

必ずスプーンや乳首、哺乳瓶などに移して飲ませて下さい。スティックのまま飲ませると赤ちゃんのくちびるや気道を傷つける等の可能性があります。

飲ませ方の注意

- ・使用直前に開封し、1回で使い切ってください。
- ・他の薬と混ぜないでください。
- ・目・鼻・耳に入らないように注意して下さい。



質問



答え

1. 飲ませる前にこぼしてしまいました。⇒ 次の分を飲ませて下さい。もらった薬が無くなった所で終了です。

2. 飲ませた後吐きました。⇒ 吸収される部分もありますので、追加は不要です。1週間後にまた飲ませて下さい。

3. 飲ませ忘れていました。⇒ 気がついた時に飲ませて下さい。そこから1週間毎飲ませ全て飲み切ってください。