

# 大腸癌

| レジメン名              | 一般名                                                   | 投与量                                                 | 投与方法         | 投与日                                       | 1サイクル | 癌種      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|---------|
| FOLFIRI            | イリノテカン<br>レボホリナート<br>フルオロウラシル<br>フルオロウラシル             | 150mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡           | 点滴静注         | day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1          | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| FOLFIRI+BEV        | ペバシズマブ<br>イリノテカン<br>レボホリナート<br>フルオロウラシル<br>フルオロウラシル   | 5mg/kg<br>150mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡ | 点滴静注         | day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1 | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| IRIS               | イリノテカン<br>S1                                          | 125mg/㎡                                             | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1, 15<br>14日間                         | 28日   | 結腸癌・直腸癌 |
| IRIS+BEV           | ペバシズマブ<br>イリノテカン<br>S1                                | 5mg/kg<br>100mg/㎡                                   | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1<br>day 1, 15<br>14日間                | 28日   | 結腸癌・直腸癌 |
| mFOLFOX6           | オキサリプラチン<br>レボホリナート<br>フルオロウラシル<br>フルオロウラシル           | 85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡            | 点滴静注         | day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1          | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| mFOLFOX6+BEV       | ペバシズマブ<br>オキサリプラチン<br>レボホリナート<br>フルオロウラシル<br>フルオロウラシル | 5mg/kg<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡  | 点滴静注         | day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1 | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| mFOLFOX6+Pmab      | パニツムマブ<br>オキサリプラチン<br>レボホリナート<br>フルオロウラシル<br>フルオロウラシル | 6mg/kg<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡  | 点滴静注         | day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1 | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| mFOLFOXIRI         | イリノテカン<br>オキサリプラチン<br>レボホリナート<br>フルオロウラシル             | 150mg/㎡<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>2400mg/㎡            | 点滴静注         | day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1          | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| mFOLFOXIRI+BEV     | ペバシズマブ<br>イリノテカン<br>オキサリプラチン<br>レボホリナート<br>フルオロウラシル   | 5mg/kg<br>150mg/㎡<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>2400mg/㎡  | 点滴静注         | day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1<br>day 1 | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| SOX                | オキサリプラチン<br>S1                                        | 130mg/㎡<br>80mg~120mg/day                           | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1<br>14日間                             | 21日   | 結腸癌・直腸癌 |
| SOX+BEV            | オキサリプラチン<br>S1                                        | 130mg/㎡<br>80mg~120mg/day                           | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1<br>14日間                             | 21日   | 結腸癌・直腸癌 |
| TAS102+BEV         | ペバシズマブ<br>TAS102                                      | 5mg/kg<br>70~150mg/day                              | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1, 15<br>1~5day 8~12day               | 28日   | 結腸癌・直腸癌 |
| XELOX (CapeOX)     | オキサリプラチン<br>カベシタピン                                    | 130mg/㎡                                             | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1<br>14日間                             | 21日   | 結腸癌・直腸癌 |
| XELOX (CapeOX)+BEV | ペバシズマブ<br>オキサリプラチン<br>カベシタピン                          | 7.5mg/kg<br>130mg/㎡                                 | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1<br>day 1<br>14日間                    | 21日   | 結腸癌・直腸癌 |
| XELIRI             | イリノテカン<br>カベシタピン                                      | 200mg/㎡<br>1800mg~3600mg/day                        | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1<br>14日間                             | 14日   | 結腸癌・直腸癌 |
| XELIRI+BEV         | ペバシズマブ<br>イリノテカン<br>カベシタピン                            | 7.5mg/kg<br>200mg/㎡<br>1800mg~3600mg/day            | 点滴静注<br>朝夕内服 | day 1<br>day 1<br>14日間                    | 21日   | 結腸癌・直腸癌 |